
Bongo (*Tragelaphus eurycerus isaaci*)

Engels : Bongo
Duits : Bongo

Indeling

Klasse : zoogdieren mammalia
Orde : evenhoevigen artiodactyla
Suborde : herkauwers ruminantia
Familie : holhoornigen bovidae
Geslacht : bosantilopen tragelaphus
Soort : bongo

Verwantschap : de bongo behoort tot de groep van schroefhoornantilopen. Hij heeft schroefvormig gedraaide horens. Door sommigen wordt hij ook wel tot het geslacht *Taurotragus* gerekend. Een andere vertegenwoordiger uit dit geslacht is de elandantiloop.

Afstamming : de eerste fossiele vondsten van holhoornigen stammen uit het Mioceen (10 – 20 miljoen jaar geleden). Dit waren de Oerhoorndragers, de *Eotragineae*. Deze dieren waren ongeveer zo groot als een ree vergelijkbaar met de Duikers van nu. Uit deze soorten ontwikkelden zich onder andere de geslachten *Tragelaphus* en *Taurotragus*

Uiterlijk

Kop-romplengte : 170 – 250 cm
Staartlengte : 45 – 65 cm
Schouderhoogte : 110 – 125 cm
Gewicht : 200 – 250 kg
Andere maten : horens tot 100 cm lang
Omschrijving uiterlijk : zowel het mannetje als het vrouwtje dragen horens. Deze zijn liervormig, dik en zwaar. De vacht is helder roodbruin met op de flanken witte strepen.

Speciale aanpassingen : de bongo heeft een tong die uitermate geschikt is om bladeren en twijgen te plukken. De bongo heeft kortere poten dan andere antilopen, waardoor hij zich toch vrij snel kan verplaatsen in het dichte oerwoud waar hij leeft.

Voortplanting

Paartijd : het hele jaar door.
Paargedrag : voor de paring 'test' de man of de vrouw voldoende paringsbereid is door met de kop en hals over de achtersrug van de vrouw te wrijven. Wordt dit niet als een bedreiging ervaren dan volgt spoedig de paring.

Plaats/bouw van nest : geen
Draagtijd : 282 – 285 dagen

Plaats/tijd van geboorte	: op een rustige plek is het bos.
Worpgrootte	: 1 per worp
Aantal worpen	: 1 maal per jaar
Jongen	
- Geboortegewicht	: ±19,5 kg
- Geboortelengte	:
- ogen open/dicht	: open
- oren open/dicht	: open
- beharing	: volledig behaard
- uiterlijk	:
Zoogtijd	: ongeveer 6 maanden
Geslachtsrijp	: na 2 jaar
Overig	: binnen een uur na de geboorte volgt het jong de moeder.

Leefwijze

Sociale structuur	: solitair, in paren of in groepen tot 50 dieren
Voedsel	: bladeren, bloemen, vruchten en twijgen. Bongo's hebben opvallend veel behoefte aan zout
Jachttechniek	: nvt
Gebit	: 32 tanden, alleen snijtanden in de onderkaak.
Activiteit	: de bongo is schuw en vooral 's nachts actief.
Overwintering	: in de natuur niet van toepassing. In de dierentuin is een verwarmd verblijf noodzakelijk
Communicatie	:
Zintuigen	:

Verspreiding

Habitat	: de bongo komt voor in het Afrikaanse regenwoud met dichte ondergroei.
Woongebied	: de oerwouden van Centraal- Afrika.
Natuurlijke vijanden	: een jonge bongo valt nogal eens ten prooi aan een python, panter of hyena. Ook voor een leeuw is een bongo niet veilig.

Overig

Maximale leeftijd	: 19 jaar
Bedreiging	: de grootste bedreiging vormt de jacht door de mens en aantasting van het leefgebied. Dit heeft er toe geleid, dat de soort in bepaalde gebieden volledig is uitgestorven
Bescherming	: deze ondersoort staat op de IUCN Rode Lijst als bedreigd. Diverse Amerikaanse dierentuinen werken mee aan een fokprogramma voor de bongo. In januari 2004 is een eerste groep dieren naar Mt. Kenya district overgebracht. Nakomelingen van deze dieren zullen in

Bijzonderheden

het wild worden uitgezet.
: lokale Afrikaanse volken beschouwen de bongo als een mysterieus dier. Zo gelooft men bijvoorbeeld dat een bongo zich met zijn hoorns hoog in de takken verankert en zich op eventuele belagers laat vallen.