

Kleinklauwotter

Kleinklauwotter of dwergotter (Amblonyx cinereus)/(Aonyx cinerea)

Engels : Oriental small (short)-clawed otter
Duits : Zwergotter

Indeling

Klasse : zoogdieren Mammalia
Orde : roofdieren Carnivora
Suborde : landroofdieren Fissipedia
Familie : marterachtigen Mustelidae
Onderfamilie : otterachtigen Lutrinae
Geslacht : dwergotter Amblonyx
Soort : kleinklauwotter Amblonyx cinereus
Verwantschap : nauw verwant aan de kaapse- en regenwoudotters.
De marterachtigen worden samen met de kleine beerachtigen, de panda's en grote beren tot de superfamilie van de marter- en beerachtige roofdieren (Arctoidae) gerekend. De otter is dus familie van de wezel, hermelijn, veelvraat, marter, das, stinkdier, kleine beren, panda's en grote beren.

Afstamming : de familie van de marterachtigen verscheen aan het begin van het Oligoceen en wordt tot de meest primitieve landroofdieren gerekend. Men doet dit onder andere omdat er zoveel verschillende aanpassingen en typen zijn. Dit duidt op een vroege splitsing in verschillende stammen. Deze veronderstelling wordt overigens door fossielen bevestigd. Potamotherium zou een voorouder van de otter zijn. Er zijn resten van hem gevonden die uit het eind van het Oligoceen en het Mioceen dateren, circa 30 miljoen jaar geleden.

Uiterlijk

Kop-romplengte : 45 - 60 cm
Staartlengte : 25 - 30 cm
Schouderhoogte :
Gewicht : 2,5 - 5 kg
Andere maten : de haren van de ondervacht zijn 6 - 9 mm lang, die van de bovenzacht 12 - 14 mm

Omschrijving uiterlijk : het lichaam is langgerekt, plat, cilindrisch. De staart lang, dik, toelopend naar een punt. De vacht lijkt wel fluweel en is bruin tot asgrijs van kleur, een grijswitte keel en buik. De voorvoeten hebben bijna geen zwemvliezen en lijken daardoor op handjes. De achtervoeten zijn wel voorzien van goede zwemvliezen.

Kleinklauwotter

Speciale aanpassingen : dat de otter uitstekend aangepast is aan het leven in water, blijkt uit de volgende eigenschappen:

- het lichaam is bijna perfect gestroomlijnd.
- de pels bestaat uit twee lagen. De onderlaag (korte wolharen) houdt lucht vast en zorgt ervoor dat de otter zo min mogelijk warmte verliest. De bovenlaag (lange dekharen) is waterafstotend en zorgt ervoor dat de onderlaag en het lichaam niet nat worden.
- de ogen, oren en neusgaten zijn afsluitbaar.
- de otter heeft een platte kop met ogen, oren en neus vrijwel op één lijn. Het voordeel hiervan is dat het dier, terwijl het aan het wateroppervlak zwemt, tegelijkertijd alle drie de zintuigen kan gebruiken zonder dat de kop echt boven het water uitgestoken hoeft te worden!
- de otter heeft een krachtige staart die als een soort roer fungeert. Bovendien zorgt dit lichaamsdeel voor stabiliteit.

Voortplanting

Paartijd : het hele jaar door.

Paargedrag : Zowel de vrouw als de man kan het paargedrag beginnen. De dieren zoeken contact, bieden zich aan, spelen, buitelen om elkaar heen buitelen en paren. Dit gebeurt op het land maar ook in het water.

Plaats/bouw van nest : het nest ligt in holten in oevers of onder boomwortels. Het ligt goed verscholen, de otter kan het via een nauwe doorgang bereiken. Soms ligt de ingang onder water.

Draagtijd : 60 – 86 dagen

Plaats : in het nest

Worpgrootte : 1 – 6 jongen

Aantal worpen : gemiddeld 1,5 per jaar, na 8 maanden is een volgend nest mogelijk.

Jongen

- geboortegewicht : 45 – 62 gram
- geboortelengte : ?
- ogen open/dicht : na 28 dagen gaan de ogen open
- oren open/dicht : ?
- beharing : licht behaard
- uiterlijk : lijken op de ouders

Zoogtijd : 60 – 80 dagen

Zelfstandig : blijven vaak jaren als familiegroep bij elkaar.

Geslachtsrijp : 1,5 - 2 jaar

Overig : speenleeftijd 82 – 120 dagen. Op een leeftijd van ongeveer 50 – 60 dagen komen de jongen uit het nest. Ze leren waar ze hun behoeften moeten doen, ze leren

Kleinklauwotter

zwemmen en moeten zelf gaan eten. Met name dit laatste maakt is moeilijk voor de jonge dieren. Als ze niet snel genoeg zelf leren eten, redden ze het niet.

Leefwijze

- Sociale structuur** : de otter leeft paarsgewijs of in familiegroepen van 4 – 15 dieren. Man en vrouw blijven bij elkaar. De vrouw dominant. Als er jongen in het nest zijn zoekt de man voedsel voor de hele familie.
- Voedsel** : kleine waterdieren, ook weekdieren en krabben, kleine zoogdieren en vogels
- Jachttechniek** : jaagt graag groepsgewijs
- Gebit** : gebitsformule: I: 3/3; C: 1/1; PM: 4/4; M: 1/2
- Activiteit** : dag actief
- Overwintering** : nvt
- Communicatie** : geluid, lijkt op vogelgeluid
- Zintuigen** : goed gehoor

Verspreiding

- Habitat** : India, zuidoost- Azië en Zuid- China
- Woongebied** : mangroven, tropisch heuvelland grenzend aan riviermondingen, meren, moerassen en overstromde rijstvelden.
- Natuurlijke vijanden** : krokodil

Overig

- Maximale leeftijd** : tot 15 jaar
- Bedreiging** : verkleining leefgebied door ontbossing, jacht voor bont en verkoop naar dierenhandel.
- Bescherming** : Volgens IUCN red list, bijna bedreigd. De soort wordt goed in de gaten gehouden.
- Bijzonderheden** : Doordat de kleinklauwotter een dagdier is en jonge otters gemakkelijk tam worden, wordt hij veel gevangen om als huisdier te worden verkocht.